



Urlaub der Berater

Achim Schröer: 5.-8. Mai

Feldbegehungen

Mittwoch, 7. Mai

um 8.30 h in Wintersheim, Maschinenhalle

Axel Dettweiler

um 13.30 h in Herschweiler-Pettersheim,

Betrieb Gerd Hauter, Bockhofstr. 11

Am Montag, 5.5. findet um 17.00 h eine Feldbegehung der **Fa. Bayer** in Eisenberg, Maschinenhalle Heilmann, statt.

Veranstaltungshinweis 22.05.

Am 22.05. findet ab 8.30 h ein **Feldtag auf Gut Westerwald** statt. Das Programm entnehmen Sie bitte dem Anhang. Fahrgemeinschaften können sich über die WhatsApp-Gruppe finden.

Fungizide im Winterweizen

Der **Winterweizen** befindet sich je nach Aussaat und Standort im EC 32-37 (Beginn Fahnenblattschieben). Der **Krankheitsdruck** ist in diesem Jahr durch die Trockenheit der letzten Wochen wesentlich geringer als im letzten Jahr, oft sind bei den bekannten Sorten (Patras, Apostel, Asory, Chevignon u.a.) aber auch nichtparasitäre Blattflecken (Stresssymptome Nachtfrost aufgetreten), welche leicht mit **Septoria tritici** verwechselt werden konnten. Die oberen 3 Blätter sind weitestgehend befallsfrei. Solange das 3. Blatt von oben sauber ist, besteht momentan **kein Handlungsbedarf für Fungizide**.

Sobald das **Fahnenblatt dann voll ausgebildet** ist, kann die Abschlussbehandlungen mit **voller Aufwandmenge** durchgeführt werden. Solange die oberen 3 Blätter aber noch gesund sind, kann diese Maßnahme auch noch hinausgeschoben werden. Mit beginnendem Ährenschieben

reichen dann in der Regel **80% der zugelassenen Aufwandmengen** aus.

Ab ca. 30 Stunden Blattnässe (momentan eher nicht in Aussicht) ist die Gefahr von Septoria tritici Neuinfektionen gegeben. Ist nur **eine einmalige** Behandlung gegen Blatt- und Ährenkrankheiten vorgesehen, dann können leistungsstarke Fungizide mit guter Dauere Wirkung wie **Ascera Xpro 1,5 l/ha**, **Revytrex+ Comet 1,5+0,5 l/ha**, **Elatus Era Sympara 1,0+0,33 l/ha** bzw. **Elatus Era Folpan 1,0+1,5 l/ha**, **Univoq 2,0 l/ha**, **Avastel Pack 1,5+0,75 l/ha**, **Jordi 1,5 l/ha**, **Vastimo 2,0 l/ha** oder der **Revistar+Priaxor Pack 1,0+1,0 l/ha** (Vertrieb RWZ) eingesetzt werden. Situationsbedingt können aber auch preisgünstigere Kombinationen wie **Elatus Era 1,0 l/ha**, **Revytrex 1,25 l/ha**, **Skyway Xpro 1,0 l/ha** oder **Balaya 1,5 l/ha** je nach Befallsdruck ihre Berechtigung haben. Die Kurativleistung beträgt je nach Produkt und Aufwandmenge 5-8 Tage.

Je nach Witterung (trocken?, nur Braunrostgefahr?) kann auch mit **Elatus Era Star 1,0+0,5 l/ha** oder preisgünstigeren Produkten wie **Pronto plus 1,25 l/ha**, **Protendo Extra Pack 0,5+0,5 l/ha**, **Amistar Gold 1,0 l/ha** od. anderen Produkten gearbeitet werden.

Eine lange Wirkungsdauer gegen Roste haben auch **Azoxystrobin 0,8 l/ha+Tebuconazol 0,8 l/ha** oder andere azoxystrobinhaltige Produkte.

Falls eine **Fusariumbehandlung (Risiko Vorfrucht Mais, nichtwendende Bodenbearbeitung, anfällige Sorte, feuchtwarme Witterung)** in der Blüte geplant ist, reichen **2/3 der normalen Aufwandmenge als Fungizidvorlage**.

Bei Doppelbehandlungen sollte immer auf **Wirkstoffwechsel** (Resistenzmanagement) geachtet werden! **Wirkungsdauer und Kurativleistung** der Produkte dürfen nicht überschätzt werden.

Die empfohlenen Produkte sind Beispiele, auch andere Produkte können eingesetzt werden.

Herbizidbehandlung im Mais

Nach den flächendeckenden Niederschlägen (vorerst wieder die letzten?) wird der gesäte Mais nun zügig auflaufen oder ist schon aufgelaufen. Das gilt auch für die Unkräuter. Um die Bodenfeuchtigkeit auszunutzen, sollten geplante VA oder frühe NA Massnahmen zeitnah durchgeführt werden (Produkte s. Rundschreiben Nr. 8) In den nächsten Tagen wird dann eher der Wind der begrenzende Faktor für Behandlungen sein.

Ackerfuchsschwanzbesatz im Mais

Auf Standorten, wo der Ackerfuchsschwanz nicht mehr ausreichend mit **Nicosulfuron** bekämpft werden kann, bietet **Maister Power, frühzeitig im 2-3 Blattstadium eingesetzt**, noch Wirkungsreserven. Gegen **AFU mit ALS Resistenz** kann mit dem **Laudis Aspect Pack** (sofern noch vorhanden) +Teilmenge nicosulfo-

ronhaltiges Produkt oft noch befriedigende Wirkungen erzielt werden. Alternativ können **Spectrum Gold 2 l/ha, jeweils mit Laudis OD 2,0l/ha+Teilmenge Nicosulfuron** eingesetzt werden.

Zulassungsende von TABARA

Die Zulassung für das Produkt TABARA (100 g/l Clopyralid) endet am 30.04.2025.

Durch das Auslaufen der Zulassung am 30.04.2025 ergeben sich aktuell folgende Fristen:

Abverkauf bis zum 30.10.2025

Aufbrauch bis zum 30.10.2026

Mit freundlichem Gruß

Knut Behrens, Norbert Rothhaar, Achim Schröer, Maximilian Stork, Thomas Keller

NG Auflagen der Maisherbizide

Terbuthylazinhaltige Produkte nur alle 3 Jahre auf der gleichen Fläche NG 362	Nicosulfuron-haltige Produkte nicht 2 Jahre hintereinander NG 237	Isoxaflutole-haltige Produkte auf derselben Fläche nicht 2 Jahre hintereinander NG 368	Peak innerhalb 3 Jahre nur einmal auf der gleichen Fläche NG 355
Maister Power Aspekt Laudis Aspekt Pack Elumis Triumph Pack Laudis Spectrum Gold Pack Successor Top 4,0 Calaris Merlin Duo Spectrum Gold Successor Top 4,0	Alle Elumis Produkte (P Pack, Triumph etc.) Tanika Mais Combo Arigo Diniro, Spandis Principal Plus Motivell forte, Nicogan, Ikanos, Primero u. viele andere	MaisterPower Flexx Pack Merlin Duo Pack Callisto P Flexx pack	Peak Elumis P Pack Callisto P Flexx Pack Diniro/Spandis Casper

Auswahl, kein Anspruch auf Vollständigkeit!

|



Ring landwirtschaftlicher Betriebsleiter e.V.

Beratungsring Ackerbau

Röchlingstr. 1, 67663 Kaiserslautern



Ring landwirtschaftlicher Betriebsleiter e.V.

Beratungsring Ackerbau

Röchlingstr. 1, 67663 Kaiserslautern



Ring landwirtschaftlicher Betriebsleiter e.V.

Beratungsring Ackerbau

Röchlingstr. 1, 67663 Kaiserslautern

